12+

Иван Старостин



ИНДЕЙКА ОТ ПОДВОРЬЯ ДО ПТИЦЕФАБРИКИ

Полное практическое руководство

Иван Старостин

Индейка от подворья до птицефабрики. Полное практическое руководство

«Издательские решения»

Старостин И.

Индейка от подворья до птицефабрики. Полное практическое руководство / И. Старостин — «Издательские решения»,

«Индейка: от подворья до птицефабрики» — уникальное практическое руководство. Раскрыты биология, породы и кроссы, инкубация, выращивание молодняка, содержание, кормление, ветеринария и экономика. Для каждой темы — три решения: ЛПХ, фермерское хозяйство, промышленная птицефабрика. Книга сочетает нормативы, таблицы и чек-листы, помогая получать стабильное мясо и яйцо, снижать риски и строить прибыльное хозяйство. Для птицеводов, фермеров, технологов и студентов.

© Старостин И.
© Издательские решения

Содержание

Часть I. Биология и породный ресурс 6
Глава 1. Биологические особенности индейки: почему это не «большая курица» 7
Глава 2. Породный ресурс: яичные, мясо-яичные и мясные породы и кроссы 9
Глава 3. Биология и продуктивность в разрезе масштабов хозяйства: «три дорожки» 12
Часть II. Технология разведения и инкубации 14
Глава 4. Формирование родительского стада и организация воспроизводства 15
Глава 5. Отбор и хранение инкубационного яйца 17
Конец ознакомительного фрагмента. 18

Индейка от подворья до птицефабрики Полное практическое руководство

Составитель Иван Старостин

© Иван Старостин, составитель, 2026

ISBN 978-5-0071-5723-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть I. Биология и породный ресурс



Индейка — самая крупная сельскохозяйственная птица, и это определяет как её преимущества (высокий убойный выход, диетическое мясо), так и сложности разведения (требовательность к условиям в раннем возрасте, склонность к ожирению, специфическое поведение). Игнорирование биологических особенностей индейки — главная причина неудач в частных хозяйствах и технологических ошибок на фермах. Эта часть закладывает фундамент для всех последующих технологических решений.

Глава 1. Биологические особенности индейки: почему это не «большая курица»

Индейка относится к отряду куриных, но по ряду ключевых физиологических и поведенческих параметров принципиально отличается от кур. Эти различия носят не «академический», а прямой технологический характер.

1.1. Низкая регуляторная способность температуры тела у молодняка

Самая критическая биологическая особенность индейки — низкая способность поддерживать постоянную температуру тела в раннем возрасте. Индюшата рождаются физиологически незрелыми в отношении терморегуляции, и их система терморегуляции «дозревает» постепенно. Наиболее комфортно они чувствуют себя в диапазоне 34—36° С в первые дни жизни. При снижении температуры ниже этого уровня индюшата начинают пищать, скучиваться и давить друг друга, что ведёт к травмам и падежу.

Практическое следствие: индюшата значительно более требовательны к температуре, чем цыплята. Это диктует необходимость тщательного контроля обогрева в брудерный период (Часть III) и объясняет, почему индейководство традиционно считается «сложной» птицей для начинающих.

1.2. Инстинкт насиживания: от 16% до полноценного материнского поведения

В отличие от перепела, полностью утратившего инстинкт насиживания, у индейки он сохранился, но сильно варьирует в зависимости от породы. У современных промышленных кроссов и линий инстинкт насиживания подавлен селекцией и составляет до 16%. В промышленном индейководстве это рассматривается как нежелательное явление, поскольку наседка прекращает яйцекладку и снижает продуктивность родительского стада.

Однако у ряда аборигенных и мясо-яичных пород (особенно у северокавказских бронзовых) инстинкт насиживания хорошо развит, что позволяет выводить молодняк без инкубатора и является ценным качеством для частных хозяйств, ориентированных на естественное разведение.

Практическое следствие: выбор породы определяет, нужен ли вам инкубатор как обязательное звено (для кроссов) или можно использовать естественное насиживание (для пород с сохранённым инстинктом).

1.3. Высокая потребность в кислороде и чувствительность к загазованности

Индейки очень чувствительны к содержанию кислорода в помещении и плохо переносят загазованность аммиаком и углекислым газом. Это обусловлено их эволюционной историей: дикие индейки передвигались на большие расстояния (до 15—20 км в день), что сформировало интенсивный газообмен и высокую потребность в кислороде.

Практическое следствие: вентиляция в птичнике для индеек должна быть более интенсивной, чем для кур сопоставимой массы. Нарушение воздухообмена быстро приводит к респираторным проблемам и снижению продуктивности.

1.4. Сохранённая способность к полёту и поведенческие особенности

В отличие от кур, у индеек до сих пор ярко выражена способность летать, особенно у растущих индюшат в утренние часы после пробуждения и вечерние — перед сном. Это связано с природной привычкой диких индеек устраиваться на ночь на высоких деревьях, чтобы избежать хищников.

Кроме того, индюшата склонны к импринтингу (запечатлению) — они способны ходить за движущимися предметами, включая обслуживающий персонал. В раннем возрасте их приходится учить клевать и «укладывать» спать после выключения света.

Практическое следствие: при содержании в открытых вольерах необходимы высокие заборы или подрезка крыльев. В закрытых птичниках важно учитывать поведение при размещении оборудования (индейки стремятся к возвышенным местам).

1.5. Склонность к ожирению и потеря живой массы у несушек

Индейки генетически предрасположены к накоплению жира, особенно тяжелые кроссы. При этом у несушек наблюдается специфическая поведенческая особенность: они постоянно сидят в ожидании самца и снижают потребление корма, что приводит к потере живой массы через 1—1,5 месяца после начала яйцекладки.

Практическое следствие: кормление индеек требует строгого нормирования (Часть V). Недокорм несушек так же опасен, как и перекорм: в первом случае птица теряет массу и снижает яйценоскость, во втором — ожиреет и перестанет нестись.

Глава 2. Породный ресурс: яичные, мясо-яичные и мясные породы и кроссы

Мировое индейководство располагает десятками пород и кроссов. Для практических целей их делят по направлению продуктивности. Выбор породы или кросса — первое экономическое решение, определяющее всю дальнейшую технологию.

2.1. Мясное направление: тяжелые кроссы и породы

Современное промышленное индейководство основано на тяжелых кроссах, которые обеспечивают максимальную скорость роста и выход мяса. Убойный выход у них достигает 80—90%, а живая масса самцов к убою — 20—25 кг и выше.

Белая широкогрудая порода — одна из самых распространенных мясных пород в мире. Существует в трех разновидностях:

Тяжелая линия: индюки 22—25 кг, индейки 10—11 кг. Яйценоскость 90—120 яиц в год.

Средняя линия: индюки 15—17 кг, индейки 6—7 кг.

Легкая линия: индюки 8—9 кг, индейки 4,5—5,5 кг.

Белая широкогрудая послужила основой для создания большинства современных кроссов. Она пригодна для клеточного содержания и характеризуется высокой продуктивностью.

Кросс «Хайбрид Конвертер» (Hybrid Converter) — современный тяжелый кросс, превосходящий белую широкогрудую по ключевым мясным показателям. По данным сравнительных исследований, предубойная масса индеек кросса «Хайбрид Конвертер» составила 12,57 кг против 10,69 кг у белой широкогрудой, убойный выход — 83,0% против 80,4%, масса потрошеной тушки — 9,28 кг против 7,47 кг. Масса грудной мышцы в потрошеной тушке — 3,44 кг (37,1%) против 2,61 кг (35,0%).

Кросс «БИГ-6» (BIG-6) — тяжелый кросс, отличающийся наибольшей продуктивностью и скороспелостью. Масса взрослого самца превышает 24 кг. Птица имеет белый окрас с темным пятнышком на груди, округлую грудь и мощную шею. По предубойной массе «БИГ-6» превосходит «Хайбрид Конвертер».

Кросс «БУТ-9» (BUT-9) — тяжелый кросс, который, по данным источников, не требует много усилий при выращивании. Индюки-бройлеры обладают хорошими мясными качествами и демонстрируют отличную выносливость.

Бронзовая широкогрудая и московская бронзовая — мясные породы с более высокой выносливостью, чем промышленные кроссы. Московская бронзовая может пастись на пастбищах, масса самцов достигает 20 кг, самок — 10 кг.

2.2. Мясо-яичное (универсальное) направление

Породы этого направления сочетают приемлемую мясную продуктивность с более высокой яйценоскостью и, что критически важно для частных хозяйств, выносливостью и неприхотливостью.

Северокавказская бронзовая — одна из старейших отечественных пород, выведенная в Ставропольском крае. Направление — мясо-яичное. Живой вес: индюки 11—15 кг (тяжелая линия), индейки 6,5—8,5 кг. Яйценоскость: 75—80 яиц у тяжелой линии, 100—120 яиц — у легкой. Масса яйца 80—95 г. Начало яйцекладки — 9—10 месяцев. Порода предназначена для фермерских и приусадебных хозяйств с возможностью выгульного содержания, обладает крепким здоровьем и высокой адаптацией. У нее хорошо развит инстинкт насиживания, что позволяет выводить молодняк без инкубатора.

Северокавказская белая — бройлерная порода, отличающаяся выносливостью. Выведена на основе широкогрудой бронзовой и белой. За год индейка способна снести до 90 яиц, масса яйца 80 г. Предназначена для использования в частных хозяйствах, неприхотлива к режиму кормления и составу корма, хорошо использует пастбище.

Московская белая — порода, которую относят к мясо-яичному направлению. Живой вес индюков 12,5—14 кг (в отдельных линиях до 16—25 кг), индеек 6,5—8 кг. Яйценоскость 100—120 яиц в год, масса яйца 85—90 г. Рекомендуется для разведения в личных подсобных и фермерских хозяйствах.

Черная тихорецкая — порода, выведенная в Краснодарском крае. Отличается плодовитостью и жизнеспособностью, имеет компактное телосложение. Живой вес взрослых индеек 7,5 кг, индюков 13 кг. По эффективности использования корма (3,73 кг корма на 10 яиц) превосходит многие другие породы.

Узбекская палевая — порода, приспособленная жить и выращивать выводок при минимальной подкормке, самостоятельно добывая корм на пастбище. Идеально подходит для частных хозяйств. Масса самца до 10 кг, самки — около 5 кг. Самки способны снести за год около 60 яиц.

2.3. Яичное направление

Чисто яичных пород индеек в современном сельском хозяйстве практически не осталось — яйцо индейки рассматривается как дополнительный продукт, а не основной. Однако некоторые породы традиционно относят к яичным.

Виргинская (или гибрид Голландский) — индейки имеют белое оперение, не достигают крупных размеров, телосложение схоже с бронзовой породой. Хорошо приспособлены к пастбищам и приусадебным участкам. Вес взрослого самца около 9 кг, самки в два раза меньше. За полгода самка способна производить около 60 яиц.

В целом яйценоскость индеек составляет 60—120 яиц в год в зависимости от породы и линии, масса яйца — 70—95 г. Яйцо индейки по вкусу и пищевой ценности не уступает куриному, но лучше хранится и превосходит его по размеру. Однако из-за относительно низкой яйценоскости ориентироваться на заработок на индюшиных яйцах в бизнесе нецелесообразно — это скорее приятный дополнительный доход.

2.4. Сравнительная таблица пород и кроссов: выбор под масштаб и цель

Порода / кросс Направление Живая масса (индюк / индейка), кг Яйценоскость, яиц/год Ключевые особенности для разных масштабов

Белая широкогрудая (тяжелая линия) Мясное 22—25 / 10—11 90—120 Птицефабрика: стандарт для промышленного производства. Ферма: возможна, но требует точного кормления. ЛПХ: слишком требовательна к условиям для начинающих.

Хайбрид Конвертер Мясное (тяжелый кросс) до 30+ / — — Птицефабрика и крупная ферма: максимальный выход мяса (убойный выход 83—85%), превосходит белую широкогрудую по всем мясным показателям.

БИГ-6 Мясное (тяжелый кросс)> 24 / — — Птицефабрика: наибольшая скороспелость и продуктивность. ЛПХ: только при наличии опыта и стабильных условий.

БУТ-9 Мясное (тяжелый кросс) — — Ферма и ЛПХ: считается менее требовательным при выращивании, хорошая выносливость.

Северокавказская бронзовая Мясо-яичное 11—15 / 6,5—8,5 75—120 ЛПХ и ферма: идеальна для выгульного содержания, сохранён инстинкт насиживания, неприхотлива.

Северокавказская белая Мясо-яичное — до 90 ЛПХ: неприхотлива к корму, хорошо использует пастбище.

Московская белая Мясо-яичное 12,5—14 / 6,5—8 100—120 ЛПХ и ферма: рекомендована для частных и фермерских хозяйств, хорошая яйценоскость.

Черная тихорецкая Мясо-яичное 13 / 7,5 80—100 Ферма: эффективный расход корма (3,73 кг/10 яиц), вынослива.

Узбекская палевая Мясо-яичное 10 / 5 ~60 ЛПХ: минимальная подкормка, пастбищное содержание, идеальна для натурального хозяйства.

Глава 3. Биология и продуктивность в разрезе масштабов хозяйства: «три дорожки»

Этот раздел — смысловое ядро части. Он показывает, как одни и те же биологические законы диктуют разные технологические решения в зависимости от масштаба.

3.1. Личное подсобное хозяйство (ЛПХ)

Цель: самообеспечение мясом и яйцом, минимальные капитальные вложения, использование пастбищ и естественных кормов.

Биологические ограничения, которые становятся преимуществами:

Небольшое поголовье (10—100 голов) позволяет использовать выгульное и пастбищное содержание, компенсируя отсутствие автоматики ручным трудом.

Сохранённый инстинкт насиживания у мясо-яичных пород (северокавказская бронзовая, узбекская палевая) избавляет от необходимости приобретать инкубатор — птица разводится естественным путём.

Неприхотливость к корму и способность использовать подножный корм (зелень, насекомые, семена) снижают затраты на покупные комбикорма.

Рекомендуемые породы: северокавказская бронзовая, северокавказская белая, московская белая, узбекская палевая, черная тихорецкая.

Критические биологические точки: температурный режим для индюшат (низкая терморегуляция — Часть III), защита от хищников и способность к полёту (высокие заборы), контроль ожирения у несушек.

3.2. Фермерское хозяйство (КФХ)

Цель: товарное производство мяса и/или яйца, устойчивый сбыт, частичная механизация.

Биологические факторы, определяющие технологию:

Поголовье от нескольких сотен до нескольких тысяч голов требует разделения на группы (родительское стадо, ремонтный молодняк, откорм) и механизации кормления и поения.

Для мясного направления критична синхронизация графиков инкубации и убоя. Тяжелые кроссы готовы к убою в 5—6 месяцев (в зависимости от кросса и целевой массы), и задержка ведёт к перерасходу корма.

Мясо-яичные породы позволяют маневрировать между рынками мяса и яйца, но требуют точного баланса рациона: универсальные породы уступают специализированным кроссам по скорости роста и выходу мяса.

Рекомендуемая структура стада: родительское стадо (для получения инкубационного яйца) + промышленное стадо на откорм. Для мясного направления — тяжелые или средние кроссы; для универсального — северокавказские и московские породы.

Критические биологические точки: вентиляция (высокая потребность в кислороде), плотность посадки (для тяжелых кроссов — не более 1,5 гол./м^2 при напольном содержании), профилактика ожирения у несушек.

3.3. Промышленная птицефабрика

Цель: максимальный объем стандартизированной продукции при минимальной себестоимости, полная автоматизация, строгая биобезопасность.

Биологические параметры, закладываемые в технологический проект:

Тяжелые кроссы («Хайбрид Конвертер», «БИГ-6») — единственный экономически оправданный выбор для промышленного производства мяса. Они обеспечивают убойный выход 80—85% и максимальную скорость роста.

Клеточное содержание для родительского стада и, в некоторых технологиях, для откорма (белая широкогрудая пригодна для клеток).

Инкубация выносится в отдельное здание (инкубаторий) с промышленными инкубаторами. Срок инкубации — 28 суток.

Ветеринарный «закрытый режим»: индейки восприимчивы к ряду инфекций (микоплазмоз, болезнь Ньюкасла, колибактериоз), поэтому биобезопасность является технологическим регламентом.

Выбор кросса для фабрики: «Хайбрид Конвертер» и «БИГ-6» для максимального выхода мяса; белая широкогрудая — как более универсальный вариант, пригодный и для клеточного содержания.

Резюме части: биология как технологический императив

Ключевой вывод Части I: биологические особенности индейки — это не «интересные факты», а прямые технологические и экономические факторы. Низкая терморегуляция молодняка диктует жёсткие требования к брудерному периоду; высокая потребность в кислороде — к вентиляции; сохранённый инстинкт насиживания у некоторых пород открывает возможность естественного разведения в ЛПХ; склонность к ожирению требует строгого нормирования кормления. Выбор породы или кросса — это не вопрос симпатии, а расчёт под конкретный рынок и масштаб: тяжелые кроссы для промышленного мяса, мясо-яичные породы для универсального фермерского и приусадебного хозяйства.

В следующей части («Технология разведения и инкубации») эти биологические предпосылки будут переведены в конкретные режимы и операции: формирование родительского стада, отбор яйца, температурно-влажностные режимы инкубации (28 суток) для разных пород и масштабов.

Часть II. Технология разведения и инкубации



Воспроизводство стада индеек — более сложный и менее «прощающий ошибки» процесс, чем у кур или перепелов. Крупные размеры самцов делают естественное спаривание затруднительным, а у тяжелых кроссов — практически невозможным; сохранённый, но нестабильный инстинкт насиживания у части пород в промышленных условиях рассматривается как нежелательное явление; наконец, инкубация яйца индейки имеет более длительный и требовательный температурно-влажностный режим. Эта часть переводит биологические предпосылки Части I в конкретные операции: формирование родительского стада, отбор и хранение яйца, режимы инкубации и их дифференциацию по масштабам хозяйства.

Глава 4. Формирование родительского стада и организация воспроизводства

Родительское стадо в индейководстве — это специализированная группа птицы, от которой получают инкубационное яйцо с высокими показателями оплодотворённости и выводимости. Ошибки при комплектовании и организации воспроизводства не исправляются последующими режимами инкубации.

4.1. Сроки комплектования и перевода в родительское стадо

Сроки перевода ремонтного молодняка в птичник родительского стада зависят от системы содержания. При напольном содержании ремонтный молодняк переводится в 17-недельном возрасте; при клеточном содержании — в 26—30 недель. В промышленном индейководстве взрослое стадо формируют к 30 неделям. При посадке ремонтного молодняка требуется в 1,2 раза больше начального поголовья родительского стада — это резерв на выбраковку и возможные потери.

Яйца для инкубации начинают использовать от птицы, достигшей 30—34-недельного возраста, в зависимости от тяжести кросса. Продолжительность продуктивного использования индеек составляет 4—5 месяцев, при этом пик яйценоскости приходится на второй месяц, после чего кривая имеет ниспадающий характер.

4.2. Половое соотношение: естественное спаривание и искусственное осеменение

Половое соотношение в родительском стаде индеек принципиально различается в зависимости от способа осеменения.

При естественном спаривании соотношение принимается 1:10 (один самец на десять самок). Однако у крупных бройлерных кроссов (БИГ-6, Хайбрид Конвертер) естественное спаривание настолько затруднено из-за большой разницы в массе самца и самки, что не является основным способом оплодотворения. Самцы при естественном спаривании часто травмируют самок, и приходится выбраковывать до 20% женских особей из-за увечий.

При искусственном осеменении (ИО) половое соотношение значительно шире: в разных источниках приводятся значения 1:16, 1:30—50 и 1:16—25 (с резервом самцов до 50%). Искусственное осеменение стало стандартной практикой в отрасли индейководства и обеспечивает уровень оплодотворённости не менее 95% в основную часть сезона размножения.

4.3. Искусственное осеменение: технологическая необходимость для тяжелых кроссов

Для тяжелых кроссов искусственное осеменение — не альтернатива, а единственный экономически оправданный способ воспроизводства. Метод имеет особое значение именно в индейководстве, где естественное спаривание затруднено из-за большой разницы между массой самца и самки.

Технически осеменение проводят с помощью шприца-полуавтомата или индивидуальных пипеток из стекла или полистирола. Глубина введения имеет значение: осеменение самок на глубину 1—2 см позволяет повысить выход индюшат на 5,2—5,6% по сравнению с осеменением на глубину 4—5 см. При использовании микрошприца с полиэтиленовой пипеткой допускается осеменение одной пипеткой 30—50 самок с обязательной дезинфекцией спиртом после каждого осеменения.

Породный нюанс: у самцов и самок продуктивный период часто не совпадает. Индейки интенсивно несутся в течение полугода, тогда как индюки способны к воспроизводству только 2—3,5 месяца; они раньше начинают линьку, при которой спермообразование затормаживается, а качество материала снижается на 50—55%. Это требует особого внимания к резерву самцов и своевременной их замене.

4.4. Борьба с инстинктом насиживания в промышленном стаде

Индейки характеризуются частым проявлением инстинкта насиживания, что резко снижает продуктивность. Факторами, располагающими к проявлению инстинкта, являются высокая температура, наличие затемнённых мест, нехватка гнёзд, редкий сбор яиц и недостаточная вентиляция.

Для борьбы с этим в промышленных птичниках предусмотрена специальная секция, разделённая на три части. В первой, самой большой, выделенных индеек содержат четыре дня вместе с самцами, без подстилки, без гнёзд, при постоянном ярком освещении и усиленной вентиляции. Тех индеек, у которых за это время инстинкт насиживания прекратился и началась яйцекладка, возвращают в постоянное стадо; остальных переводят во второе, а затем в третье отделение с сетчатым или планчатым полом.

4.5. «Три дорожки»: организация воспроизводства на разных масштабах

Масштаб Подход к комплектованию и осеменению Ключевые особенности

ЛПХ Естественное спаривание при соотношении 1:8—1:10; для пород с сохранённым инстинктом насиживания (северокавказская бронзовая, узбекская палевая) возможно естественное насиживание без инкубатора. Простота и низкие затраты; риск травматизма самок при естественном спаривании у тяжелых кроссов; для ЛПХ предпочтительны мясо-яичные породы с более лёгким самцом.

Ферма (КФХ) Комплектование ремонтным молодняком в 17 недель (напольное содержание) или 26—30 недель (клеточное). Естественное спаривание 1:10 или ИО при наличии обученного персонала. Возможность работы с средними кроссами; при переходе на тяжелые кроссы ИО становится обязательным; необходим резерв самцов (до 20%).

Птицефабрика Многократное комплектование стада (индейки трёх сроков одновременно) для равномерного поступления яйца в течение года. ИО при соотношении 1:16—1:50. Без ИО промышленное воспроизводство тяжелых кроссов невозможно; обязательна система борьбы с инстинктом насиживания; контроль продуктивности ежедневный, живой массы — не реже 1 раза в 4 недели по 50 голов из птичника.

Глава 5. Отбор и хранение инкубационного яйца

Инкубационное яйцо индейки — сырьё с жёстко заданными параметрами. Яйцо, пригодное для пищевых целей, может быть категорически непригодно для инкубации.

5.1. Требования к массе и морфологии

Масса инкубационного яйца индейки зависит от типа и кросса и составляет в среднем 85—90 г, с общим диапазоном 70—105 г. Минимальная масса для допуска к инкубации — не менее 70 г. Слишком мелкие яйца дают слабый молодняк, а слишком крупные (свыше 100 г) часто имеют проблемы с газообменом из-за избыточной толщины скорлупы.

Скорлупа индюшиного яйца довольно толстая (0,36—0,46 мм) и прочная, с пятнистым рисунком и утолщёнными подскорлупными оболочками. Это создаёт как преимущество (защита от механических повреждений), так и сложность (затруднённый газообмен на поздних стадиях инкубации, особенно у кроссов с плотной скорлупой, таких как Хайбрид Конвертер).

5.2. Признаки непригодности и овоскопирование

Перед закладкой яйца осматривают и просвечивают на овоскопе. Для отбора жизнеспособных яиц проводится овоскопия: жидкость внутри оболочки должна быть прозрачной и однородной, без сгустков и инородных тел; желток — правильной формы, расположен в центре; воздушная камера — в полусфере большого радиуса. Недопустимо использование деформированных экземпляров, слишком мелких яиц, а также яиц с повреждениями скорлупы (трещинами, наростами). Овоскопирование также позволяет контролировать развитие эмбрионов и своевременно выбраковывать яйца с патологиями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.