12+

Иван Старостин



ИНДЕЙКА ОТ ПОДВОРЬЯ ДО ПТИЦЕФАБРИКИ

Полное практическое руководство

Иван Старостин

Индейка от подворья до птицефабрики. Полное практическое руководство

https://litres.ru/74790028
ISBN 9785007157230

Аннотация

«Индейка: от подворья до птицефабрики» — уникальное практическое руководство. Раскрыты биология, породы и кроссы, инкубация, выращивание молодняка, содержание, кормление, ветеринария и экономика. Для каждой темы — три решения: ЛПХ, фермерское хозяйство, промышленная птицефабрика. Книга сочетает нормативы, таблицы и чек-листы, помогая получать стабильное мясо и яйцо, снижать риски и строить прибыльное хозяйство. Для птицеводов, фермеров, технологов и студентов.

Содержание

Часть I. Биология и породный ресурс 5
Глава 1. Биологические особенности индейки: почему это не «большая курица» 7
Глава 2. Породный ресурс: яичные, мясо-яичные и мясные породы и кроссы 11
Глава 3. Биология и продуктивность в разрезе масштабов хозяйства: «три дорожки» 18
Часть II. Технология разведения и инкубации 23
Глава 4. Формирование родительского стада и организация воспроизводства 25
Глава 5. Отбор и хранение инкубационного яйца 30
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Индейка от подворья до птицефабрики Полное практическое руководство

Составитель Иван Старостин

© Иван Старостин, составитель, 2026

ISBN 978-5-0071-5723-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть I. Биология и породный ресурс



Индейка — самая крупная сельскохозяйственная птица, и это определяет как её преимущества (высокий убойный выход, диетическое мясо), так и сложности разведения (требовательность к условиям в раннем возрасте, склонность к ожирению, специфическое поведение). Игнорирование биологических особенностей индейки — главная причина неудач в частных хозяйствах и технологических ошибок на фермах. Эта часть закладывает фундамент для всех

последующих технологических решений.

Глава 1. Биологические особенности индейки: почему это не «большая курица»

Индейка относится к отряду куриных, но по ряду ключевых физиологических и поведенческих параметров принципиально отличается от кур. Эти различия носят не «академический», а прямой технологический характер.

1.1. Низкая регуляторная способность температуры тела у молодняка

Самая критическая биологическая особенность индейки — низкая способность поддерживать постоянную температуру тела в раннем возрасте. Индюшата рождаются физиологически незрелыми в отношении терморегуляции, и их система терморегуляции «дозревает» постепенно. Наиболее комфортно они чувствуют себя в диапазоне 34—36° С в первые дни жизни. При снижении температуры ниже этого уровня индюшата начинают пищать, скучиваться и давить друг друга, что ведёт к травмам и падежу.

Практическое следствие: индюшата значительно более требовательны к температуре, чем цыплята. Это диктует необходимость тщательного контроля обогрева в брудерный

период (Часть III) и объясняет, почему индейководство традиционно считается «сложной» птицей для начинающих.

1.2. Инстинкт насиживания: от 16% до полноценного материнского поведения

В отличие от перепела, полностью утратившего инстинкт насиживания, у индейки он сохранился, но сильно варьирует в зависимости от породы. У современных промышленных кроссов и линий инстинкт насиживания подавлен селекцией и составляет до 16%. В промышленном индейководстве это рассматривается как нежелательное явление, поскольку наседка прекращает яйцекладку и снижает продуктивность родительского стада.

Однако у ряда аборигенных и мясо-яичных пород (особенно у северокавказских бронзовых) инстинкт насиживания хорошо развит, что позволяет выводить молодняк без инкубатора и является ценным качеством для частных хозяйств, ориентированных на естественное разведение.

Практическое следствие: выбор породы определяет, нужен ли вам инкубатор как обязательное звено (для кроссов) или можно использовать естественное насиживание (для пород с сохранённым инстинктом).

1.3. Высокая потребность в кислороде и чувствительность

к загазованности

Индейки очень чувствительны к содержанию кислорода в помещении и плохо переносят загазованность аммиаком и углекислым газом. Это обусловлено их эволюционной историей: дикие индейки передвигались на большие расстояния (до 15—20 км в день), что сформировало интенсивный газообмен и высокую потребность в кислороде.

Практическое следствие: вентиляция в птичнике для индеек должна быть более интенсивной, чем для кур сопоставимой массы. Нарушение воздухообмена быстро приводит к респираторным проблемам и снижению продуктивности.

1.4. Сохранённая способность к полёту и поведенческие особенности

В отличие от кур, у индеек до сих пор ярко выражена способность летать, особенно у растущих индюшат в утренние часы после пробуждения и вечерние — перед сном. Это связано с природной привычкой диких индеек устраиваться на ночь на высоких деревьях, чтобы избежать хищников.

Кроме того, индюшата склонны к импринтингу (запечатлению) — они способны ходить за движущимися предметами, включая обслуживающий персонал. В раннем возрасте их приходится учить клевать и «укладывать» спать после выключения света.

Практическое следствие: при содержании в открытых вольерах необходимы высокие заборы или подрезка крыльев. В закрытых птичниках важно учитывать поведение при размещении оборудования (индейки стремятся к возвышенным местам).

1.5. Склонность к ожирению и потеря живой массы у несушек

Индейки генетически предрасположены к накоплению жира, особенно тяжелые кроссы. При этом у несушек наблюдается специфическая поведенческая особенность: они постоянно сидят в ожидании самца и снижают потребление корма, что приводит к потере живой массы через 1—1,5 месяца после начала яйцекладки.

Практическое следствие: кормление индеек требует строгого нормирования (Часть V). Недокорм несушек так же опасен, как и перекорм: в первом случае птица теряет массу и снижает яйценоскость, во втором — ожиреет и перестанет нестись.

Глава 2. Породный ресурс: яичные, мясо-яичные и мясные породы и кроссы

Мировое индейководство располагает десятками пород и кроссов. Для практических целей их делят по направлению продуктивности. Выбор породы или кросса — первое экономическое решение, определяющее всю дальнейшую технологию.

2.1. Мясное направление: тяжелые кроссы и породы

Современное промышленное индейководство основано на тяжелых кроссах, которые обеспечивают максимальную скорость роста и выход мяса. Убойный выход у них достигает 80—90%, а живая масса самцов к убою — 20—25 кг и выше.

Белая широкогрудая порода — одна из самых распространенных мясных пород в мире. Существует в трех разновидностях:

Тяжелая линия: индюки 22—25 кг, индейки 10—11 кг. Яйценоскость 90—120 яиц в год.

Средняя линия: индюки 15—17 кг, индейки 6—7 кг.

Легкая линия: индюки 8—9 кг, индейки 4,5—5,5 кг.

Белая широкогрудая послужила основой для создания большинства современных кроссов. Она пригодна для клеточного содержания и характеризуется высокой продуктивностью.

Кросс «Хайбрид Конвертер» (Hybrid Converter) — современный тяжелый кросс, превосходящий белую широкогрудую по ключевым мясным показателям. По данным сравнительных исследований, предубойная масса индеек кросса «Хайбрид Конвертер» составила 12,57 кг против 10,69 кг у белой широкогрудой, убойный выход — 83,0% против 80,4%, масса потрошеной тушки — 9,28 кг против 7,47 кг. Масса грудной мышцы в потрошеной тушке — 3,44 кг (37,1%) против 2,61 кг (35,0%).

Кросс «БИГ-6» (BIG-6) — тяжелый кросс, отличающийся наибольшей продуктивностью и скороспелостью. Масса взрослого самца превышает 24 кг. Птица имеет белый окрас с темным пятнышком на груди, округлую грудь и мощную шею. По предубойной массе «БИГ-6» превосходит «Хайбрид Конвертер».

Кросс «БУТ-9» (BUT-9) — тяжелый кросс, который, по данным источников, не требует много усилий при выращивании. Индюки-бройлеры обладают хорошими мясными качествами и демонстрируют отличную выносливость.

Бронзовая широкогрудая и московская бронзовая — мясные породы с более высокой выносливостью, чем промышленные кроссы. Московская бронзовая может пастись на пастбищах, масса самцов достигает 20 кг, самок — 10 кг.

2.2. Мясо-яичное (универсальное) направление

Породы этого направления сочетают приемлемую мясную продуктивность с более высокой яйценоскостью и, что критически важно для частных хозяйств, выносливостью и неприхотливостью.

Северокавказская бронзовая — одна из старейших отечественных пород, выведенная в Ставропольском крае. Направление — мясо-яичное. Живой вес: индюки 11—15 кг (тяжелая линия), индейки 6,5—8,5 кг. Яйценоскость: 75—80 яиц у тяжелой линии, 100—120 яиц — у легкой. Масса яйца 80—95 г. Начало яйцекладки — 9—10 месяцев. Порода предназначена для фермерских и приусадебных хозяйств с возможностью выгульного содержания, обладает крепким здоровьем и высокой адаптацией. У нее хорошо развит инстинкт насиживания, что позволяет выводить молодняк без

инкубатора.

Северокавказская белая — бройлерная порода, отличающаяся выносливостью. Выведена на основе широкогрудой бронзовой и белой. За год индейка способна снести до 90 яиц, масса яйца 80 г. Предназначена для использования в частных хозяйствах, неприхотлива к режиму кормления и составу корма, хорошо использует пастбище.

Московская белая — порода, которую относят к мясо-яичному направлению. Живой вес индюков 12,5—14 кг (в отдельных линиях до 16—25 кг), индеек 6,5—8 кг. Яйценоскость 100—120 яиц в год, масса яйца 85—90 г. Рекомендуется для разведения в личных подсобных и фермерских хозяйствах.

Черная тихорецкая — порода, выведенная в Краснодарском крае. Отличается плодовитостью и жизнеспособностью, имеет компактное телосложение. Живой вес взрослых индеек 7,5 кг, индюков 13 кг. По эффективности использования корма (3,73 кг корма на 10 яиц) превосходит многие другие породы.

Узбекская палевая — порода, приспособленная жить и выращивать выводок при минимальной подкормке, самостоятельно добывая корм на пастбище. Идеально подходит для

частных хозяйств. Масса самца до 10 кг, самки — около 5 кг. Самки способны снести за год около 60 яиц.

2.3. Яичное направление

Чисто яичных пород индеек в современном сельском хозяйстве практически не осталось — яйцо индейки рассматривается как дополнительный продукт, а не основной. Однако некоторые породы традиционно относят к яичным.

Виргинская (или гибрид Голландский) — индейки имеют белое оперение, не достигают крупных размеров, телосложение схоже с бронзовой породой. Хорошо приспособлены к пастбищам и приусадебным участкам. Вес взрослого самца около 9 кг, самки в два раза меньше. За полгода самка способна производить около 60 яиц.

В целом яйценоскость индеек составляет 60—120 яиц в год в зависимости от породы и линии, масса яйца — 70—95 г. Яйцо индейки по вкусу и пищевой ценности не уступает куриному, но лучше хранится и превосходит его по размеру. Однако из-за относительно низкой яйценоскости ориентироваться на заработок на индюшиных яйцах в бизнесе нецелесообразно — это скорее приятный дополнительный доход.

2.4. Сравнительная таблица пород и кроссов: выбор под масштаб и цель

Порода / кросс Направление Живая масса (индюк / индейка), кг Яйценоскость, яиц/год Ключевые особенности для разных масштабов

Белая широкогрудая (тяжелая линия) Мясное 22—25 / 10—11 90—120 Птицефабрика: стандарт для промышленного производства. Ферма: возможна, но требует точного кормления. ЛПХ: слишком требовательна к условиям для начинающих.

Хайбрид Конвертер Мясное (тяжелый кросс) до 30+ / — — Птицефабрика и крупная ферма: максимальный выход мяса (убойный выход 83—85%), превосходит белую широкогрудую по всем мясным показателям.

БИГ-6 Мясное (тяжелый кросс)> 24 / — — Птицефабрика: наибольшая скороспелость и продуктивность. ЛПХ: только при наличии опыта и стабильных условий.

БУТ-9 Мясное (тяжелый кросс) — — Ферма и ЛПХ: считается менее требовательным при выращивании, хорошая выносливость.

Северокавказская бронзовая Мясо-яичное 11—15 / 6,5—8,5 75—120 ЛПХ и ферма: идеальна для выгульного содержания, сохранён инстинкт насиживания, неприхотлива.

Северокавказская белая Мясо-яичное — до 90 ЛПХ: неприхотлива к корму, хорошо использует пастбище.

Московская белая Мясо-яичное 12,5—14 / 6,5—8 100—120 ЛПХ и ферма: рекомендована для частных и фермерских хозяйств, хорошая яйценоскость.

Черная тихорецкая Мясо-яичное 13 / 7,5 80—100 Ферма: эффективный расход корма (3,73 кг/10 яиц), выносliва.

Узбекская палевая Мясо-яичное 10 / 5 ~60 ЛПХ: минимальная подкормка, пастбищное содержание, идеальна для натурального хозяйства.

Глава 3. Биология и продуктивность в разрезе масштабов хозяйства: «три дорожки»

Этот раздел — смысловое ядро части. Он показывает, как одни и те же биологические законы диктуют разные технологические решения в зависимости от масштаба.

3.1. Личное подсобное хозяйство (ЛПХ)

Цель: самообеспечение мясом и яйцом, минимальные капитальные вложения, использование пастбищ и естественных кормов.

Биологические ограничения, которые становятся преимуществами:

Небольшое поголовье (10—100 голов) позволяет использовать выгульное и пастбищное содержание, компенсируя отсутствие автоматики ручным трудом.

Сохранённый инстинкт насиживания у мясо-яичных пород (северокавказская бронзовая, узбекская палевая) избавляет от необходимости приобретать инкубатор — птица разводится естественным путём.

Неприхотливость к корму и способность использовать подножный корм (зелень, насекомые, семена) снижают затраты на покупные комбикорма.

Рекомендуемые породы: северокавказская бронзовая, северокавказская белая, московская белая, узбекская палевая, черная тихорецкая.

Критические биологические точки: температурный режим для индюшат (низкая терморегуляция — Часть III), защита от хищников и способность к полёту (высокие заборы), контроль ожирения у несушек.

3.2. Фермерское хозяйство (КФХ)

Цель: товарное производство мяса и/или яйца, устойчивый сбыт, частичная механизация.

Биологические факторы, определяющие технологию:

Поголовье от нескольких сотен до нескольких тысяч голов требует разделения на группы (родительское стадо, ремонтный молодняк, откорм) и механизации кормления и поения.

Для мясного направления критична синхронизация графиков инкубации и убоя. Тяжелые кроссы готовы к убою в

5—6 месяцев (в зависимости от кросса и целевой массы), и задержка ведёт к перерасходу корма.

Мясо-яичные породы позволяют маневрировать между рынками мяса и яйца, но требуют точного баланса рациона: универсальные породы уступают специализированным кроссам по скорости роста и выходу мяса.

Рекомендуемая структура стада: родительское стадо (для получения инкубационного яйца) + промышленное стадо на откорм. Для мясного направления — тяжелые или средние кроссы; для универсального — северокавказские и московские породы.

Критические биологические точки: вентиляция (высокая потребность в кислороде), плотность посадки (для тяжелых кроссов — не более 1,5 гол./м^2 при напольном содержании), профилактика ожирения у несушек.

3.3. Промышленная птицефабрика

Цель: максимальный объем стандартизированной продукции при минимальной себестоимости, полная автоматизация, строгая биобезопасность.

Биологические параметры, закладываемые в технологический проект:

Тяжелые кроссы («Хайбрид Конвертер», «БИГ-6») — единственный экономически оправданный выбор для промышленного производства мяса. Они обеспечивают убойный выход 80—85% и максимальную скорость роста.

Клеточное содержание для родительского стада и, в некоторых технологиях, для откорма (белая широкогрудая пригодна для клеток).

Инкубация выносится в отдельное здание (инкубаторий) с промышленными инкубаторами. Срок инкубации — 28 суток.

Ветеринарный «закрытый режим»: индейки восприимчивы к ряду инфекций (микоплазмоз, болезнь Ньюкасла, колибактериоз), поэтому биобезопасность является технологическим регламентом.

Выбор кросса для фабрики: «Хайбрид Конвертер» и «БИГ-6» для максимального выхода мяса; белая широкогрудая — как более универсальный вариант, пригодный и для клеточного содержания.

Резюме части: биология как технологический императив
Ключевой вывод Части I: биологические особенности ин-

дейки — это не «интересные факты», а прямые технологические и экономические факторы. Низкая терморегуляция молодняка диктует жёсткие требования к брудерному периоду; высокая потребность в кислороде — к вентиляции; сохранённый инстинкт насиживания у некоторых пород открывает возможность естественного разведения в ЛПХ; склонность к ожирению требует строгого нормирования кормления. Выбор породы или кросса — это не вопрос симпатии, а расчёт под конкретный рынок и масштаб: тяжелые кроссы для промышленного мяса, мясо-яичные породы для универсального фермерского и приусадебного хозяйства.

В следующей части («Технология разведения и инкубации») эти биологические предпосылки будут переведены в конкретные режимы и операции: формирование родительского стада, отбор яйца, температурно-влажностные режимы инкубации (28 суток) для разных пород и масштабов.

Часть II. Технология разведения и инкубации



Воспроизводство стада индеек — более сложный и менее «прощающий ошибки» процесс, чем у кур или перепелов. Крупные размеры самцов делают естественное спаривание затруднительным, а у тяжелых кроссов — практически невозможным; сохранённый, но нестабильный инстинкт насиживания у части пород в промышленных условиях рассматривается как нежелательное явление; наконец, инкубация яйца индейки имеет более длительный и требователь-

ный температурно-влажностный режим. Эта часть переводит биологические предпосылки Части I в конкретные операции: формирование родительского стада, отбор и хранение яйца, режимы инкубации и их дифференциацию по масштабам хозяйства.

Глава 4. Формирование родительского стада и организация воспроизводства

Родительское стадо в индейководстве — это специализированная группа птицы, от которой получают инкубационное яйцо с высокими показателями оплодотворённости и выводимости. Ошибки при комплектовании и организации воспроизводства не исправляются последующими режимами инкубации.

4.1. Сроки комплектования и перевода в родительское стадо

Сроки перевода ремонтного молодняка в птичник родительского стада зависят от системы содержания. При напольном содержании ремонтный молодняк переводится в 17-недельном возрасте; при клеточном содержании — в 26—30 недель. В промышленном индейководстве взрослое стадо формируют к 30 неделям. При посадке ремонтного молодняка требуется в 1,2 раза больше начального поголовья родительского стада — это резерв на выбраковку и возможные потери.

Яйца для инкубации начинают использовать от птицы, до-

стигшей 30—34-недельного возраста, в зависимости от тяжести кросса. Продолжительность продуктивного использования индеек составляет 4—5 месяцев, при этом пик яйценоскости приходится на второй месяц, после чего кривая имеет ниспадающий характер.

4.2. Половое соотношение: естественное спаривание и искусственное осеменение

Половое соотношение в родительском стаде индеек принципиально различается в зависимости от способа осеменения.

При естественном спаривании соотношение принимается 1:10 (один самец на десять самок). Однако у крупных бройлерных кроссов (БИГ-6, Хайбрид Конвертер) естественное спаривание настолько затруднено из-за большой разницы в массе самца и самки, что не является основным способом оплодотворения. Самцы при естественном спаривании часто травмируют самок, и приходится выбраковывать до 20% женских особей из-за увечий.

При искусственном осеменении (ИО) половое соотношение значительно шире: в разных источниках приводятся значения 1:16, 1:30—50 и 1:16—25 (с резервом самцов до 50%). Искусственное осеменение стало стандартной практикой в отрасли индейководства и обеспечивает уровень оплодотво-

рённости не менее 95% в основную часть сезона размножения.

4.3. Искусственное осеменение: технологическая необходимость для тяжелых кроссов

Для тяжелых кроссов искусственное осеменение — не альтернатива, а единственный экономически оправданный способ воспроизводства. Метод имеет особое значение именно в индейководстве, где естественное спаривание затруднено из-за большой разницы между массой самца и самки.

Технически осеменение проводят с помощью шприца-полуавтомата или индивидуальных пипеток из стекла или полистирола. Глубина введения имеет значение: осеменение самок на глубину 1—2 см позволяет повысить выход индюшат на 5,2—5,6% по сравнению с осеменением на глубину 4—5 см. При использовании микрошприца с полиэтиленовой пипеткой допускается осеменение одной пипеткой 30—50 самок с обязательной дезинфекцией спиртом после каждого осеменения.

Породный нюанс: у самцов и самок продуктивный период часто не совпадает. Индейки интенсивно несутся в течение полугода, тогда как индюки способны к воспроизводству только 2—3,5 месяца; они раньше начинают линьку, при ко-

торой спермообразование затормаживается, а качество материала снижается на 50—55%. Это требует особого внимания к резерву самцов и своевременной их замене.

4.4. Борьба с инстинктом насиживания в промышленном стаде

Индейки характеризуются частым проявлением инстинкта насиживания, что резко снижает продуктивность. Факторами, располагающими к проявлению инстинкта, являются высокая температура, наличие затемнённых мест, нехватка гнёзд, редкий сбор яиц и недостаточная вентиляция.

Для борьбы с этим в промышленных птичниках предусмотрена специальная секция, разделённая на три части. В первой, самой большой, выделенных индеек содержат четыре дня вместе с самцами, без подстилки, без гнёзд, при постоянном ярком освещении и усиленной вентиляции. Тех индеек, у которых за это время инстинкт насиживания прекратился и началась яйцекладка, возвращают в постоянное стадо; остальных переводят во второе, а затем в третье отделение с сетчатым или планчатым полом.

4.5. «Три дорожки»: организация воспроизводства на разных масштабах

Масштаб Подход к комплектованию и осеменению Ключевые особенности

ЛПХ Естественное спаривание при соотношении 1:8—1:10; для пород с сохранённым инстинктом насиживания (северокавказская бронзовая, узбекская палевая) возможно естественное насиживание без инкубатора. Простота и низкие затраты; риск травматизма самок при естественном спаривании у тяжелых кроссов; для ЛПХ предпочтительны мясо-яичные породы с более лёгким самцом.

Ферма (КФХ) Комплектование ремонтным молодняком в 17 недель (напольное содержание) или 26—30 недель (клеточное). Естественное спаривание 1:10 или ИО при наличии обученного персонала. Возможность работы с средними кроссами; при переходе на тяжелые кроссы ИО становится обязательным; необходим резерв самцов (до 20%).

Птицефабрика Многократное комплектование стада (индейки трёх сроков одновременно) для равномерного поступления яйца в течение года. ИО при соотношении 1:16—1:50. Без ИО промышленное воспроизводство тяжелых кроссов невозможно; обязательна система борьбы с инстинктом насиживания; контроль продуктивности ежедневный, живой массы — не реже 1 раза в 4 недели по 50 голов из птичника.

Глава 5. Отбор и хранение инкубационного яйца

Инкубационное яйцо индейки — сырьё с жёстко заданными параметрами. Яйцо, пригодное для пищевых целей, может быть категорически непригодно для инкубации.

5.1. Требования к массе и морфологии

Масса инкубационного яйца индейки зависит от типа и кросса и составляет в среднем 85—90 г, с общим диапазоном 70—105 г. Минимальная масса для допуска к инкубации — не менее 70 г. Слишком мелкие яйца дают слабый молодняк, а слишком крупные (свыше 100 г) часто имеют проблемы с газообменом из-за избыточной толщины скорлупы.

Скорлупа индюшиного яйца довольно толстая (0,36—0,46 мм) и прочная, с пятнистым рисунком и утолщёнными подскорлупными оболочками. Это создаёт как преимущество (защита от механических повреждений), так и сложность (затруднённый газообмен на поздних стадиях инкубации, особенно у кроссов с плотной скорлупой, таких как Хайбрид Конвертер).

5.2. Признаки непригодности и овоскопирование

Перед закладкой яйца осматривают и просвечивают на

овоскопе. Для отбора жизнеспособных яиц проводится овоскопия: жидкость внутри оболочки должна быть прозрачной и однородной, без сгустков и инородных тел; желток — правильной формы, расположен в центре; воздушная камера — в полусфере большого радиуса. Недопустимо использование деформированных экземпляров, слишком мелких яиц, а также яиц с повреждениями скорлупы (трещинами, наростами). Овоскопирование также позволяет контролировать развитие эмбрионов и своевременно выбраковывать яйца с патологиями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.