12+





ГУСЬ ОТ ПОДВОРЬЯ ДО ПТИЦЕФАБРИКИ

Книга по содержанию и получению прибыли

Иван Старостин

Гусь от подворья до птицефабрики. Книга по содержанию и получению прибыли

«Издательские решения»

Старостин И.

Гусь от подворья до птицефабрики. Книга по содержанию и получению прибыли / И. Старостин — «Издательские решения»,

«Гусь от подворья до птицефабрики» — полное практическое руководство. В книге: биология и породы, три технологии содержания — подворье, ферма, птицефабрика, кормление, инкубация, ветеринарная профилактика, бизнес-план и сбыт. Даны нормы, сроки, цены в руб. и юридические требования. Настольная книга для птицевода-любителя, фермера и специалиста.

© Старостин И.
© Издательские решения

Содержание

Часть I. Биология и породное разнообразие (Фундамент) 6
Глава 1. Гусь как биологический вид и объект хозяйствования 6
Глава 2. Породный атлас: выбор стратегии 9
Конец ознакомительного фрагмента. 13

Гусь от подворья до птицефабрики Книга по содержанию и получению прибыли

Составитель Иван Старостин

© Иван Старостин, составитель, 2026

ISBN 978-5-0071-5930-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть I. Биология и породное разнообразие (Фундамент)

Глава 1. Гусь как биологический вид и объект хозяйствования

Гусь — птица, которая при всей своей внешней простоте устроена принципиально иначе, чем курица или индейка. Многие ошибки начинающих гусеводов связаны именно с тем, что к гусю пытаются подходить с «куриными» мерками. Между тем его биология диктует совершенно особые требования к кормлению, содержанию и даже к тому, в каком возрасте имеет смысл забивать птицу на мясо.



1.1. Пищеварение: почему гусь — не курица

Главная биологическая особенность гуся — его пищеварительный тракт. У гусей он длиннее туловища примерно в 11 раз, тогда как у кур — только в 8 раз. Это не абстрактная цифра: удлиненный кишечник — анатомическая основа способности гусей эффективно перерабатывать большое количество объемистых растительных кормов. Именно поэтому гусь может съедать на пастбище до 2 кг зелени в сутки, оставаясь продуктивным.

Однако у этой особенности есть и обратная сторона. Гуси крайне требовательны к качеству корма и обладают выраженной избирательностью. Они, например, полностью отказываются от вико-зерновых смесей из-за содержащегося в них глюкозида вицинина, вредного для организма. Зато охотно поедают молодую зелень, причем в определенной последовательности: в первую очередь — одуванчик, клевер (красный, белый, шведский), люцерну желтую, пырей ползучий; во вторую — мятлик луговой, полевицу белую, тимофеевку луговую. Это знание напрямую пригодится при планировании пастбищного содержания на подворье и ферме.

Для автора книги здесь важен практический вывод: гусь — пастбищное животное по своей природе, и игнорирование этого факта ведет либо к неоправданному удорожанию кормления, либо к снижению продуктивности.

1.2. Линька: биологический «стоп-кран» продуктивности

Линька у гусей — не просто смена оперения, а процесс, который напрямую управляет хозяйственной эффективностью. Взрослые гуси линяют дважды в год: первая линька приходится на середину лета, вторая — на осень. Линька длится около 60 дней, при этом сменяется не только покровное оперение, но и маховые перья крыла, и рулевые перья.

Ключевой момент для гусевода: в период линьки интенсивность роста молодняка резко снижается, а затраты кормов значительно возрастают. Иными словами, если вы планируете выращивание на мясо, вы не должны «попасть» в линьку. Отсюда — важнейший технологический ориентир: формирование мясной продуктивности у гусей в основном завершается к 8—9-недельному возрасту, когда мясо имеет лучший вкус и высокую питательность.

Более того, наступление ювенальной (молодняковой) линьки можно сдвинуть. При интенсивном выращивании она наступает раньше, и причиной преждевременного наступления могут стать чрезмерная плотность посадки, нарушения условий воздушной среды и другие внешние факторы. Это еще один аргумент в пользу того, что биология и технология содержания в гусеводстве неразделимы: плохие условия содержания напрямую «включают» биологический механизм, который останавливает рост и обесценивает корм.

1.3. Мясная продуктивность: окно возможностей и точка «перелома»

Понимание того, как формируется мясо гуся, — ключ к экономике любого масштаба. В тушках гусят-бройлеров 8—9-недельного возраста мышечная ткань составляет 35—37% массы, кожа с подкожным жиром — 14—17%, внутренний жир — около 6,5%. Химический состав мяса в этом возрасте: влага — 56,7—59,4%, протеин — 17,6—18,2%, жир — 21,5—22,8%. Белок мышц гусят по содержанию ряда незаменимых аминокислот (лизин, гистидин) превосходит белок мяса бройлеров.

Но после 12-недельного возраста картина резко меняется: количество жира в тушке увеличивается до 25—30% за счет кожи с подкожным жиром и до 10% — за счет внутреннего жира. Это и есть та самая «точка перелома». Выращивать гуся дольше 12 недель на мясо в большинстве случаев экономически нецелесообразно: вы начинаете кормить жир, а не мышцы. Исключение — специальные технологии откорма на жирную печень, но это отдельный, узкий сегмент, о котором речь пойдет в части о фермерском производстве.

1.4. Иммунитет и адаптивность: чем силен гусь

Гусь традиционно считается птицей с крепким иммунитетом и высокой адаптивностью. Это подтверждается и породными характеристиками: например, у кубанских гусей отмечают крепкий иммунитет и хорошую адаптацию к разному климату и пастбищному содержанию, у переяславских — хорошую жизнеспособность и крепкий иммунитет молодняка. Однако эта устойчивость не абсолютна. Она работает только в связке с правильными условиями содержания: чистой подстилкой, вентиляцией без сквозняков, полноценным кормлением.

Для книги важно сразу зафиксировать принципиальную позицию, которая пройдет через все части: на подворье крепкий иммунитет гуся действительно позволяет обходиться без мас-

сированной ветеринарной интервенции, но на промышленном уровне без протоколов биобезопасности и вакцинации устойчивость породы не спасает. Биология дает резерв, но не отменяет технологию.

1.5. Что из биологии следует для трех масштабов

Связка «биология → технология» в этой главе должна прозвучать явно:

Подворье может опираться на пастбищное содержание и естественную устойчивость птицы, но обязано считаться с линькой и не передерживать птицу на мясо сверх 12 недель.

Ферма обязана управлять плотностью посадки и микроклиматом, чтобы не провоцировать преждевременную ювенальную линьку и не терять прирост.

Птицефабрика строит всю технологию вокруг точного знания сроков формирования мясной продуктивности и использует принудительную линьку как инструмент продления продуктивного периода — но об этом в соответствующей главе.

Глава 2. Породный атлас: выбор стратегии

Порода в гусеводстве — это не «красивое название», а выбор бизнес-модели. Одна и та же птица не может одновременно давать 100 яиц в год и тушку на 6 кг за два месяца. Поэтому атлас построен не по алфавиту, а по целевому назначению: яичное (лёгкое), мясное (тяжёлое), универсальное и редкое (декоративное / бойцовое) направления.



Общая рамка такова: породы гусей условно делят на тяжелые (мясо-сальные), средние (декоративные) и легкие (яичные). Внутри этой рамки и будем двигаться.

2.1. Яичное (лёгкое) направление: ставка на количество

Пород, которые действительно можно назвать «яичными», немного, и их экономика строится не на массе тушки, а на количестве и качестве яйца. При этом даже «яичные» породы дают вполне пригодное мясо — компактные тушки удобны в приготовлении и ценятся покупателями.

Китайская белая и серая. Живая масса гусаков — 5—6 кг, гусынь — 4—4,5 кг. Молодняк достигает 3,5 кг к 3 месяцам. Яйценоскость — до 100 яиц в год массой 140—160 г. Гуси активны, более агрессивны по сравнению с другими породами, но оплодотворяемость яиц и выживаемость птенцов высокие. Отлично приспособлены к пастбищному содержанию, могут набирать массу, поедая только зеленый корм, но плохо переносят холод. Инстинкт насиживания выражен слабо — для разведения нужен инкубатор.

Кубанская. Живая масса гусаков — 5,5—6 кг, гусынь — 5—5,5 кг. Молодняк достигает 3 кг к 2 месяцам. Яйценоскость — 75—85 яиц (по отдельным данным, до 90—100) массой 140—160 г. Порода выведена скрещиванием китайских и горьковских гусей. Продуктивность гусынь выше всего в первый год яйцекладки. Крепкий иммунитет, хорошая адаптация к климату и пастбищному содержанию, нуждаются в водоеме. Оплодотворенность и выживаемость высокие, но инстинкт насиживания не развит.

Переяславская. Промежуточный вариант: живая масса гусаков 5,5—6 кг, гусынь 4,5—5 кг, молодняк набирает 3 кг к 2 месяцам, яйценоскость 40—60 яиц массой 160—180 г. Неприхотливы, устойчивы к погодным условиям, гусыни могут насиживать, но для продуктивности используют инкубатор.

Практический вывод для читателя: если цель — максимальное количество яиц, смотрите на китайскую (до 100 яиц) или кубанскую (75—90, с крепким иммунитетом и адаптивностью). Но сразу закладывайте в план инкубатор: у обеих пород насиживание практически отсутствует.

2.2. Мясное (тяжёлое) направление: ставка на массу и скорость роста

Тяжелые породы — это ядро товарного мясного гусеводства. Здесь ключевые показатели — живая масса взрослой птицы и, что важнее для экономики, масса в 9 недель, то есть к моменту завершения формирования мясной продуктивности.

Порода Масса в 9 недель Взрослая масса Яйценоскость Ключевая особенность

Мамут 4—4,5 кг 9—13 кг — Классический «тяжеловес», мясо-сальное направление

Холмогорская 4—5 кг 8—12 кг 35—45 яиц Универсальность, хорошие наседки

Линда — (к 10 нед. 5 кг) 8—9 кг (гусаки), 6,5—7 кг (гусыни) ~50 яиц Сочетание мяса и воспроизводства

Губернаторская 4—4,4 кг (самцы до 4,5 кг) 7—9 кг 40—50 яиц Аутосексность, сохранность до 95—98%

Крупная серая 4,5 кг 6,5—9,5 кг — Выносливость, холодостойкость

Источники по таблице:.

Разберем ключевые позиции подробнее.

Мамут. Относится к мясо-сальному направлению. Живая масса взрослых особей достигает 9 кг у гусынь и 11 кг у гусаков, а в 9 недель — 4—4,5 кг. Это порода для тех, кто готов мириться с определенными особенностями ради выдающейся массы. Важно понимать: чем тяжелее порода, тем выше требования к качеству корма и тем сложнее может быть воспроизводство.

Холмогорская. Одна из старейших отечественных пород. Средняя живая масса гусаков — 7—8 кг, гусынь — 6—7 кг, в 60 дней молодняк достигает 3,9—4,2 кг. В 9 недель — 4—5 кг, взрослая птица — 8—12 кг. Гусыни — хорошие наседки. Порода универсальная: дает большое количество высококачественного мяса, жира, пера и пуха. Для фермера это важное преимущество: можно строить доход не только на тушке.

Линда. Порода, которая считается одной из лучших в мире среди крупных. Живая масса гусаков 8—9 кг, гусынь 6,5—7,0 кг, гусят в 10-недельном возрасте — 5 кг. Линдовские гуси имеют сравнительно высокую живую массу и высокую сохранность молодняка; в пять месяцев их вес превышает 7 кг, а спустя год — 11 кг. Яйценоскость — около 50 яиц в год. Это оптимальный выбор для фермерского хозяйства, где важна не только масса, но и рентабельность за счет низкого отхода.

Губернаторская. Относительно молодая порода (зарегистрирована в 2011 году). Цвет пера и пуха белый. К 9 неделям юные самцы набирают до 4,5 кг. Характеризуется высокими показателями конверсии кормов, неприхотливостью, устойчивостью к холодам, а главное —

аутосексностью, позволяющей определить пол птенцов в первые дни жизни. Яйценоскость — 40—50 яиц в год. Аутосексность — недооцененное преимущество: она снижает затраты на сортировку и позволяет точнее планировать выращивание.

Крупная серая. В 9 недель — 4,5 кг, взрослая — 6,5—9,5 кг. Порода выносливая, холодостойкая, с хорошим здоровьем и нетребовательна к кормам, может нормально расти без доступа к водоему, гусыни — хорошие наседки. Это «рабочая лошадка» для регионов с суровым климатом.

Практический вывод: для товарного мяса в 9 недель ориентируйтесь на массу 4—5 кг. Если нужен максимум массы взрослой птицы — Мамут и Холмогорская. Если нужен баланс массы, сохранности и яйценоскости — Линда и Губернаторская. Если важна холодостойкость и неприхотливость — Крупная серая.

2.3. Универсальные и редкие породы: ниши и особые качества

За пределами «чистого» яичного и мясного направления есть пласт пород, которые либо сочетают продуктивные качества, либо занимают особые ниши — от печеночного откорма до декоративного содержания.

Венгерская белая. Гусак 6—7 кг, гусыня 5—6 кг, яйценоскость 40—45 яиц в год, масса яйца 140—150 г. Славится высокими откормочными качествами, способностью хорошо расти на выгуле, возможностью получения крупной жирной печени при специальном откорме, дает нежное мясо и перопуховое сырье. Недостатки — плохая переносимость низких температур и сырости, повышенная подверженность некоторым инфекциям.

Виштинес. Выведена в Литве. Ценится за отличные материнские качества самок, быстрый рост молодняка (двухмесячный гусенок весит 4—4,2 кг), возможность откорма на печень и прекрасный пух. Крепкое здоровье, хорошая адаптация к неблагоприятным факторам; мясной выход с тушки — около 70%, продукция нежная, нежирная.

Датский Легарт. Одна из лучших крупных пород, пригодная для мяса, печени и пуха: при регулярном ощипывании с одной особи за год можно получить около 500 г пуха. Мясо нежное, высокого качества. Недостатки — слабо развитый материнский инстинкт и невысокая устойчивость к холодам (зимой требует отапливаемого птичника).

Итальянская белая. Несмотря на «южное» происхождение, неплохо приспособилась к климату средней полосы. Крепкое здоровье, активный, но неагрессивный нрав. Может содержаться без водоема. Дает мясную продукцию высочайшего качества и крупную (около 7% живого веса) жирную печень. Широко используется для скрещивания с более тяжелыми породами. Недостаток — почти полностью подавленный инстинкт насиживания.

Тульская бойцовая. Живая масса гусаков 5—6,5 кг, гусынь 5—5,5 кг, молодняк достигает 4 кг к 2 месяцам, яйценоскость — до 30 яиц массой 160—180 г. Выведена для боев, поэтому агрессивна и склонна к дракам за место в иерархии. Сильные, крепкие, выносливые, хорошо переносят холодный климат. Яйценоскость низкая, но гусыни — отличные наседки. Для товарного производства эта порода — нишевый выбор, но для тех, кому нужна выносливая птица с сильным материнским инстинктом и хорошим мясом, она представляет интерес.

Курчавая (Ленточная) и другие декоративные. Относятся к средней (декоративной) группе. Живая масса гусят в 9 недель — 3,2—3,5 кг. Разводятся преимущественно птицеводами-любителями как декоративные. В книге они важны не как товарная опция, а как напоминание: породное разнообразие гусей шире, чем «мясо» и «яйцо», и часть читателей может искать именно нишевую, эстетическую или бойцовую птицу.

2.4. Сводная логика выбора

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.